

MONITORING WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH
Zgodnie z przeznaczeniem jezioro powinno spełniać wymagania określone dla życia w warunkach naturalnych ryb
karpiowatych

Obiekt badań	Jezioro Świętno				
Okres badań	I – XII 2007				
Wskaźnik jakości wody	Jednostka	Wymagania dotyczące wód śródlądowych będących środowiskiem życia ryb		Wartość średnia z rocznych badań	Procent wyników poniżej wartości granicznej [%]
		Karpiowatych			
		Wartość graniczna			
Temperatura wody	°C	28,0		12,76	100
Tlen rozpuszczony	mg O ₂ /dm ³	≥ 5	100 % wyników	10,01	100
Tlen rozpuszczony	mg O ₂ /dm ³	≥ 8	50 % wyników	10,01	67
Odczyn	pH	6 - 9		8,12	100
Zawiesiny ogólne	mg/dm ³	wartość średnioroczna nie większa niż 25 mg/l		2,6	100
BZT ₅	mg O ₂ /dm ³	6		3,06	100
Fosfor ogólny	mg PO ₄ /dm ³	0,4		0,103	100
Azotyny	mg NO ₂ /dm ³	0,03		0,008	100
Związki fenolowe	mg C ₆ H ₅ OH/dm ³	2		nie stwierdzono	100
Węglowodory ropopochodne	mg/l	pogorszenie smaku ryb, widoczne warstwy na powierzchni, 3		nie stwierdzono	100
Niejonowy amoniak	mg NH ₃ /dm ³	0,025		0,005	100
Azot amonowy	mg N-NH ₄ /dm ³	0,78		0,229	100
Całkowity chlor pozostały	mg HOCL/dm ³	0,005, przy pH = 6, dopuszczalne większe wartości przy pH wyższym		0,072	100
Cynk ogólny	mg Zn/dm ³	1		0,063	100
Miedź rozpuszczona	mg Cu/dm ³	0,04		0,006	100
Ocena:	Woda jeziora odpowiada wymaganiom, jakim winny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych.				
Uwagi:					